



ELICA* Pomada
Furoato de Mometasona

COMPOSICION

Cada gramo de ELICA Pomada contiene:

Furoato de Mometasona (DCI) 1 mg

Excipientes: Hexilenglicol, estearato de propilenglicol, cera blanca, vaselina blanca, ácido fosfórico y agua purificada c.s.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Pomada. Tubos de 30 g y 60 g.

ACTIVIDAD

El furoato de mometasona es un corticoide tópico utilizado en las afecciones de la piel. Posee propiedades antiinflamatorias, antipruríticas y vasoconstrictoras.

TITULAR

Farmacéutica Essex, S.A.
C/ Cantabria, 2 – Edificio Amura
28108 Alcobendas (Madrid)

FABRICANTE

Schering-Plough, S.A.
Km. 36, Ctra. Nal. I - San Agustín de Guadalix -Madrid

INDICACIONES

ELICA Pomada está indicado para el alivio de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden al tratamiento con glucocorticoides tales como psoriasis, dermatitis atópicas, dermatitis irritantes y/o alérgicas por contacto.

CONTRAINDICACIONES

Como ocurre con otros corticosteroides tópicos, ELICA Pomada también está contraindicado en pacientes con ciertas afecciones de la piel, particularmente infecciones producidas por bacterias, virus u hongos.

ELICA Pomada está contraindicado en la varicela, las reacciones a las vacunas, la tuberculosis y la sífilis.

PRECAUCIONES

Como con todas las preparaciones tópicas de corticosteroides se deberán tomar las precauciones apropiadas cuando se traten superficies corporales extensas, cuando se utilicen curas oclusivas, en tratamientos a largo plazo o en aplicaciones en la piel de la cara o pliegues cutáneos.

Como con todos los corticoides tópicos potentes, se deberá evitar la supresión brusca del tratamiento.

Evitar cualquier contacto con los ojos.

* Marca Registrada

INTERACCIONES

Informe a su médico si está tomando cualquier otro medicamento.

ADVERTENCIAS:

Antes de aplicar ELICA Pomada, informe a su médico:

- Si está embarazada o amamantando.
- De cualquier otra afección que padezca, sobre todo si se trata de una infección.

Embarazo y lactancia

ELICA Pomada no deberán emplearlo las mujeres embarazadas o en período de lactancia, excepto por prescripción médica.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No procede.

Uso en ancianos

No existen datos específicos para ancianos.

Uso en niños

No se tienen datos sobre la utilización en niños, en caso necesario el médico valorará la utilización o no de este producto.

POSOLOGIA

Aplique suficiente cantidad de ELICA Pomada una vez al día hasta cubrir la zona afectada y ejerza un suave masaje, tal como le ha indicado su médico. No cubra ni vende la zona tratada a menos que se lo haya indicado su médico.

ELICA Pomada se le ha recetado para su afección. No dé este medicamento a otras personas y no lo use para otros trastornos. Si alguna vez olvida aplicarse ELICA Pomada, hágalo lo antes posible y continúe luego con el tratamiento regular.

SOBREDOSIS

Hasta el momento no se ha informado de casos de intoxicación con ELICA Pomada. Si, por accidente, ingiriere ELICA Pomada, consulte inmediatamente a su médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

Consulte a su médico si tuviese hormigueo, picor o signos de adelgazamiento de la piel. Se han descrito los siguientes efectos secundarios con el uso de otros corticosteroides tópicos, por lo que podrían parecer

con mometasona: irritación, aumento del vello cutáneo, disminución de la coloración de la piel, inflamación de la piel alrededor de la boca, alergias de la piel por contacto con el medicamento, ablandamiento de la piel e infección sobreagregada, estrías y sarpullido.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACION

Conservar el medicamento alejado del calor. No conserve el medicamento una vez caducado o cuando ya no lo necesite.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES

ELICA Crema: tubos con 30 g y 60 g.

ELICA Solución: frascos con 30 ml y 60 ml.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Texto revisado: Enero 2006

Laboratorios Farmacéutica Essex, S.A.
C/ Cantabria, 2 – Edificio Amura
28108 Alcobendas (Madrid)